FIG. 1

FIG. 2

Lichen striatus

DELPHINE BREIL
Centre médical des armées de Villacoublay, Villacoublay Air, France
delphine.breil@free.fr

D. Breil déclare n'avoir aucun lien d'intérêts.

Cette patiente de 32 ans consultait pour une éruption cutanée prurigineuse d'apparition brutale et d'évolution ascendante du poignet droit vers le coude. À l'examen, l'éruption était linéaire, faite de maculo-papules infiltrées érythémateuses, séparées par de la peau saine tout le long du bras (fig. 1).
La patiente n'avait pas d'antécédent, ne prenait pas de traitement, était apyrétique et l'examen clinique était sans particularité. Un lichen striatus était alors évoqué et la patiente traitée par des corticoïdes locaux plusieurs semaines entraînant la disparition des lésions les plus récentes et une régression des papules les plus anciennes qui prenaient une couleur cuivrée avant de laisser la place à des zones hypopigmentées (fig. 2).
Un an plus tard, la patiente avait une nouvelle poussée linéaire au niveau du membre inférieur droit (face antéro-interne du tibia et partie médiale du dos du pied). Les caractéristiques des lésions étaient similaires à celles de la première poussée. Une nouvelle corthicothérapie locale était prescrite avec une évolution identique.

Le lichen striatus[1] est une éruption linéaire transitoire ayant comme caractéristique de suivre les lignes de Blaschko, et ce de façon unilatérale.
Le principal diagnostic différentiel dans cette observation est le lichen plan linéaire cutané.[2,3]
L'histologie montre une spongiose alors que dans le lichen plan linéaire il existe un infiltrat lichénien en bande sans spongiose.
La guérison est spontanée en quelques semaines à 2 ou 3 ans avec possibilité d'une hypopigmentation post-inflammatoire et de récidive. Cette dermatose est particulièrement fréquente chez l'enfant.

RÉFÉRENCES
1. Cuny JF, Truchetet F. Lichen striatus. Ann Dermatol Venereol 2001;128:275-9.
2. Herd RM, McLaren KM, Aldridge RD. Linear lichen planus and lichen striatus-opposite ends of a spectrum. Clin Exp Dermatol 1993;18:335-7.
3. Rubio FA, Robayna G, Herranz P, et al. Linear lichen planus and lichen striatus : is there an intermediate form between these conditions? Clin Exp Dermatol 1997;22:61-2.

TOUS DROITS RESERVES - LA REVUE DU PRATICIEN